

## COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI SONDRIO

### GALLO FORCELLO - Risultati dei censimenti tardo-estivi 2015

Denominazione area	LIVRIO – MERIGGIO	S. STEFANO GRIONI	CANALE M. ROLLA	ACQUAN.	TOTALE
Superficie censita Ha	616	567	409	304	1896
Femmine adulte sole	3	6	3	2	14
Femmine ad. con covata	9	12	6	4	31
Gruppi di giovani	4+5+3+5+4+4+2	3+4+4+4+4+1	5+3+3+5+6+5	4+3+4+5	
Gruppi di giovani	4+4	3+6+4+4+6+6			
Indeterminati giovani totali	35	49	27	16	127
<b>TOTALI PARZIALI</b>	48	67	36	22	173
Giovani/FF tot. = S.R.	<b>2,92</b>	<b>2,72</b>	<b>3,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,82</b>
Giovani/covata	3,89	4,08	4,50	4,00	4,10
Densità autunnale/100 Ha					9,12
Densità giovani/100 Ha					6,70

### Proiezione delle consistenze e piani di prelievo 2015

COMPENSORIO OMOGENEO	OROBICO	RETICO	TOTALE	OROBICO	RETICO
Superficie dell'habitat Ha (1/3 VALORE P.F.V.2015)	4666	6007	10673	14000	18022
Giovani stimati	313	402	715	938	1207
Covate	76	98	175	229	295
Maschi ad. stimati in PRIMAVERA	99	115	214	99	115
Maschi totali	255	316	571	568	719
PRELIEVO POTENZIALE (20%)	51	63	114	114	144
PRELIEVO PROPOSTO	35	35	70		

La proiezione elaborata sull'estensione dell'habitat riportato nel Piano Faunistico-Venatorio 2007 (e bozza 2015), è sovrastimata. Il prelievo, in un'annata indubbiamente buona, secondo questo Comitato di Gestione, applicando i valori indicati dal P.F.V., risulta del tutto improponibile per una buona gestione (dati di prelievo evidenziati). E' opportuno che si provveda pertanto a un ricalcolo dei valori degli areali vocati per tale specie e peraltro si procede alla formulazione d'ipotesi di prelievo utilizzando 1/3 dei valori indicati nel piano faunistico.

I risultati dei censimenti primaverili ottenuti da 20 arene su 57 nelle Retiche e da 23 su 43 arene sulle Orobie, sono stati significativi.

I risultati del censimento estivo nelle aree campione, in rapporto ad un'annata favorevole dal punto di vista meteorologico, hanno dato un numero di giovani buono; ciò deriva dal numero medio di giovani per covata pari a 4,10.

Sono state inoltre individuate altre covate in aree censite: in zona Musella (Retiche) 4 covate, per un totale di 15 giovani e sul versante Orobico (Scais Venina e Val Madre) 5 covate per un totale giovani 22. Questi dati non sono stati conteggiati nell' ipotesi di prelievo, ma confermano l'andamento della specie.

Sulla base dei dati rilevati, si può procedere alla formulazione di ipotesi di prelievo.

In considerazione della qualità dell'area censita e dei dati emersi, si intende consolidare il trend positivo riscontrato negli ultimi anni nel territorio del Compensorio, considerando anche il dato di S.R. corrispondente al N Juv/FF tot = 2,82 che consentirebbe, secondo le indicazioni del PFV, prelievi corrispondenti al 20%.

Si propone il prelievo contenuto di 70 capi con l'intento di mantenere un buon contingente per le stagioni successive, ed eventuale compensazione di capi morti o feriti, non recuperati.