

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI SONDRIO

COTURNICE - Risultati dei censimenti tardo-estivi 2016

Denominazione area	MERIGGIO	SALINE	MARA	SCAIS	TOT.
Superficie censita Ha	185	105	415	436	1141
Adulti senza covata	0	1	0	3	4
Femmine ad. con covata	1	2	2	4	9
Giovani per covata	6	5+6	3+4	5+10+6+4	
Totale Giovani	6	11	7	25	49
TOTALI PARZIALI	7	14	9	32	62
Giovani/covata	6,0	5,5	3,5	6,3	5,44
Densità autunnale/100 Ha					5,43
Densità giovani/100 Ha					4,29

Proiezione delle consistenze e piani di prelievo 2016

COMPENSORIO OMOGENEO	RETICO	Orobico	Retico	Orobico	
Sup. areale Ha (1/3 VALORE P.F.V.2007)	10885	4138	32653	12416	
Giovani stimati sull'areale	467	178	1402	533	
Popolazione autunnale	591	225	1774	675	
PRELIEVO POTENZIALE (10%)	59	22	177	67	
PRELIEVO RICHIESTO	13	12			

La proiezione effettuata sull'estensione dell'habitat, secondo i dati riportati nel Piano Faunistico-Venatorio 2007 (e bozza 2015), è sovrastimata. Il prelievo attuabile in un'annata buona, utilizzando i valori proposti dal P.F.V., è improponibile per una buona gestione secondo questo Comitato di Gestione (dati di prelievo evidenziato in azzurro).

Si procede alla formulazione d'ipotesi di prelievo utilizzando 1/3 dei valori indicati nel piano faunistico.

I risultati del censimento estivo nelle aree campione, in rapporto ad un'annata favorevole dal punto di vista meteorologico, hanno dato un numero di covate e di giovani buono, con un numero medio di giovani per covata pari a 5,44.

Sono state inoltre individuate 4 covate sulle Retiche e 3 sulle Orobie al di fuori delle aree (aree campione), questi dati non sono inseriti nel conteggio per il prelievo, ma confermano l'andamento della specie.

Sulla base dei dati rilevati, si può procedere alla formulazione di ipotesi di prelievo In considerazione della qualità dell'estensione censita.

Nonostante le misure precauzionali introdotte nella tabella evidenziano come il prelievo potenziale si assesti utilizzando una percentuale di per sé più bassa del proponibile corrispondente al 10%, si ritiene a scopo prudenziale un prelievo contenuto di 13 capi sulle Retiche e 12 capi sulle Orobie.